

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.08.13.)

a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Kiadva: 2015.08.13. 12:00-kor.

Érvényes: 2015.08.20-ig.

Várható frissítés: 2015.08.20. 12:00-kor.



A szőlőkben továbbra is a gyors ütemű érés és az aszály a meghatározó jelenség. A növényvédelmi helyzet sem változott, nincs jelenleg növényvédelmi teendő az ültetvényekben. Az elkövetkező 7 napban ígért száraz, meleg időjárásban további gyors érés várható.



Aki mégis permetezni szeretne, annak a héten már javasolt külön választani a fajtákat érési idő szerint a növényvédelem tekintetében. A korai fajták esetében fűrtpermetezés ajánlott a botritisz és a molyok ellen fele vízmennyiséggel. A késői fajták esetében teljes felületre, a szokásos mennyiségű vízzel, kontakt réz és kén használata javasolt, kiegészítve rovarölő szerrel. Figyeljünk a réz 21 napos élelmezés-egészségügyi várakozási idejére, ami sok helyen meglepheti majd a gazdát a tervezett szüret időpontjának "előbbre csúszása" esetében.



Az atkák ellen, ahol nem szükséges feltétlenül, ne védekezzünk atkaölő szerrel. Helyette javasoljuk a kén folyamatos - a lehetőségekhez mérten a legnagyobb dózisú (4-5 kg is lehet egyes kénkészítményeknél) - kijuttatását. Minden egyes kénes kezelés után az atkák száma 20%-kal csökkenhet.



Az érő szőlőben óhatatlanul előfordulnak bogyósérülések. A kirepedő bogyókból kipréselődő cukros nedvet szívesen látogatják a méhek. A darazsak saját maguk is képesek sebzést ejteni a bogyón, és ezt követően elfogyasztani az édes csemegét.



Az idei évben sok a darázs, jelentősebb károsításukra lehet számítani. A bogyók károsítása a meleg időjárásban, az egyre édesebb szőlőn jelentős lehet.



A szőlőtőkék közé kihelyezett darázscsapdával jelentősen csökkenthetjük a darazsak számát, és ezáltal a kártétel mértékét. Kaphatók külön erre a célra fejlesztett csapdák.



Házilag is készíthetünk kiváló darázscsapdákat. Egy pillepalack és némi cukros folyadék kell hozzá. Ezek a csapdák is hatékonyan fogják a darazsakat.



A szőlőmolyok károsítása folyamatos. A lepkék rajzása lezárult. A fiatal lárvák most jelentek meg a bogyókban. Vizsgáljuk át a fürtöket, és ahol szövedéket vagy lárvára utaló rágást észlelünk, ott haladéktalanul permetezzünk.



Az érés időszakában a lárvák egyenként rágják meg a bogyókat. A sérült bogyók hamar rothadásnak indulnak és az egész fürt a szürkepenész károsításának eshet áldozatul.



A nyári kánikulai, száraz időjárásban a tőkék sok helyen stresszhelyzetbe kerültek. A vízhiány akadályozta a tápanyagok optimális felvételét és hasznosítását. Ennek eredménye részben most látszik a szőlőn.



A termés mennyisége jó az idei évben, de ahol nem ritkítottak az időjáráshoz alkalmazkodva, ott a relatívan túlterhelt tőkéken a bogyó- és fütrészzelhalások tünetei megjelentek.



A meteorológiai állomások által mért adatok

08.06-13.	Heti átlaghőmérséklet (oC)	Csapadékösszeg (mm)
Csákberény	28,8	0,0
Csókakó	28,9	0,0
Mór	26,7	0,0
Zámoly	27,3	0,0

Vasárnapig erős kánikula, de vasárnaptól jelentősen szelídül a nagy meleg, kiadós záporok, viharos zivatarfoltok valószínűek. Növényvédelmi munkákat a héten biztonságosan lehet végezni. A következő 7 napban a Borvidéken 3 mm csapadék várható (Forrás: <http://www.eumet.hu/>).

A fent felsorolt betegségek ellen a Syngenta a következő készítményeket ajánlja.

A 	ajánlata erre a hétre: atkák ellen Vertimec Pro lisztharmat és atkák ellen Thiovit Jet lisztharmat ellen Topas 100 EC, Dynali peronoszpóra ellen Neoram 37,5 WG lisztharmat, peronoszpóra, szürkepenész ellen: Quadris Max molyok és rágó kártevők ellen Karate Zeon 5 CS molyok ellen Affirm kabócák ellen Actara SC gyomok ellen Medallon Premium
---	--

Sokan nyaralni mennek hosszabb időre, és szüret előtt szeretnék biztonságban tudni a szőlőt, nekik nyújt segítséget a botritisz elleni készítmények élelmezés-egészségügyi várakozási idejét feltüntető tájékoztatás:

Rezek 21 nap

Folpet és folpet tartalmú készítmények 30 nap

Chorus 14 nap

Switch 28 nap

Quadris Max 30 nap