

## Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.08.20.)

### a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

**Kiadva: 2015.08.20. 12:00-kor.**

**Érvényes: 2015.08.27-ig.**

**Várható frissítés: 2015.08.27. 12:00-kor.**

Változó mennyiségű csapadék (13-45 mm) esett az elmúlt héten a Borvidéken. Az aszályt követően ez mentőövnök is tekinthető a szőlő számára, bár több kultúra esetében (pl. kukorica) már későn jött a csapadék.

A csapadékot követően a cukrosodó bogyókon megjelenthetnek a botritiszfertőzés tünetei. További terjedésének elejét vehetjük, ha a folpet és a réz hatóanyagok használatát előtérbe helyezzük. A korai fajtáknál figyeljünk a készítmények hosszú (21-30 nap) várakozási idejére. Az érésben előrébb jutott fajtáknál a réz és a kén hatóanyagok mellé nyomatékosan javasolható botritisz elleni készítmény hozzáadása is. Ezzel megelőzhetjük a cukrosodó bogyókon elinduló rothadási folyamatokat. Éréskor majd pedig ezt megismételve rothadásmentesen tudjuk tartani a szőlőt.

Jelentős botritisz járvány kialakulásával a korai fajták esetében nem kell számolni, de többszöri eső hatására lassan felszaporodhat a korokozó, és a közép- és késői érésű fajtákban szeptember végére már erősebb fertőzések is lehetnek. A Borvidéken egyelőre nem találoztunk felrepedt bogyókkal.

Az élelmezés-egészségügyi várakozási időkre figyeljünk. A betegség ellen kitűnő készítmények állnak rendelkezésre, a várakozási idők általában 7-14-21-30 naposak, így igényünkhöz - szüretünkhöz - igazított szert választhatunk.

Nyomatékosan kiemelnénk azonban, hogy jelenleg még nem találni botritiszes fürtöket az állományokban. További esők esetén azonban - tekintve az előzményeket - jelentős fertőzés alakulhat ki a szüreti időszakra.

A szőlőmolyok károsítása folyamatos. A lepkék rajzása lezárult. A fiatal lárvák most jelentek meg a bogyókban. Vizsgáljuk át a fürtöket, és ahol szövedéket vagy lárvára utaló rágást észlelünk, ott haladéktalanul permetezzünk. Az érés időszakában a lárvák egyenként rágják meg a bogyókat. A sérült bogyók hamar rothadásnak indulnak és az egész fürt a szürkepenész károsításának eshet áldozatul.


Mind a gombaölő mind a rovarölő szerek kijuttatásánál ügyeljünk a jó fedettség elérésére. A mostani időszakban a 600 liter víz/ha vízmennyiséggel történő permetezés a legeredményesebb.

#### A meteorológiai állomások által mért adatok

<b>08.13-19.</b>	<b>Heti átlaghőmérséklet (oC)</b>	<b>Csapadékösszeg (mm)</b>
<b>Csákberény</b>	<b>23,7</b>	<b>13,0</b>
<b>Csókakó</b>	<b>23,6</b>	<b>44,8</b>
<b>Mór</b>	<b>22,5</b>	<b>34,8</b>
<b>Zámoly</b>	<b>23,6</b>	<b>20,0</b>

Vasárnaptól enyhe időre van kilátás. Növényvédelmi munkákat a héten biztonságosan lehet végezni. A következő 7 napban a Borvidéken 8 mm csapadék várható (Forrás: <http://www.eumet.hu/>).

A fent felsorolt betegségek ellen a Syngenta a következő készítményeket ajánlja.

A 	ajánlata erre a hétre: atkák ellen Vertimec Pro lisztharmat és atkák ellen Thiovit Jet lisztharmat ellen Thiovit Jet peronoszpóra ellen Neoram 37,5 WG szürkepenész ellen: Chorus 50 WG, Switch 62,5 WG molyok és rágó kártevők ellen Karate Zeon 5 CS molyok ellen Affirm kabócák ellen Actara SC gyomok ellen Medallon Premium
--	--

Sokan a szüret előtt szeretnék biztonságban tudni a szőlőt, nekik nyújt segítséget a botritisz elleni készítmények élelmezés-egészségügyi várakozási idejét feltüntető tájékoztatás:

Rezek 21 nap

Folpet és folpet tartalmú készítmények 30 nap

Chorus 14 nap

Switch 21 nap (bor) 35 nap (csemege)

Quadris Max 30 nap

A fent felsorolt betegségek ellen a Syngenta a következő készítményeket ajánlja.