

## Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.08.21.)

### a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

**Kiadva: 2014.08.21. 12:00-kor.**

**Érvényes: 2014.08.28-ig.**

**Várható frissítés: 2014.08.28. 12:00-kor.**

**Fenológiai fázis: zsendülés, érés**


**Tarka szőlómoly fogás: 0 db/csapda/hét**

**Időjárás: Változékony idő**

**Veszélyhelyzet: Szürkepenész, Peronoszpóra, Lisztharmat, Molyok lárvái**



A cukrosodó bogyókon megjelentek a botritiszfertőzés tünetei. További terjedésének elejét vehetjük, ha a folpet és a réz hatóanyagok használatát előtérbe helyezzük. A korai fajtáknál figyeljünk a készítmények hosszú (21-30 nap) várakozási idejére. Az érésben előrébb jutott fajtáknál (Kék Oportó, Zweigelt, Pinot Noir) a réz és a kén hatóanyagok mellényomatékosan javasolható botritisz elleni készítmény hozzáadása is. Ezzel megelőzhetjük a cukrosodó bogyókon elinduló rothadási folyamatokat. Éréskor majd pedig ezt megismételve rothadásmentesen tudjuk tartani a szőlőt.



A tömött fűrtű és/vagy rothadásra hajlamos fajták esetében további fokozott veszélyt jelent a botritisz a termésre. A botritiszfertőzés járványtanához tartozik, hogy a már kialakult fertőzést nem tudjuk "gyógyítani", így a megelőzés kiemelten fontos ennek a gombabetegségnek az esetében. Az idei évben ne sajnáljuk a szürkepenész elleni védelemre a pénzt. Tegyük ezt annak ellenére, hogy az eddigiek során egy átlagos évhez képest többet költöttünk a szőlőre. Az érés során 20-30%-os termésvesztés is kialakulhat a botritisz ellen nem védett ültetvényekben. Az elmúlt hetekben sok csapadék esett a Borvidéken, ami miatt a szürkepenész "beleköltözött" a fűrtőkbe. Az érő, cukrosodó bogyóállományban robbanásszerűen szétterjedhet a fertőzés újabb esők hatására. A szürkepenészes állományokban éréskor a beteg bogyók szinte biztosan "befertőzik" az ép, cukros bogyókat, és a fajták többségénél - a védelem nélkül hagyott szőlőkben - jelentős kár keletkezhet szüretre.

Az elviaszosodott felszínű, zsendülő bogyóállomány már egyre kevésbé fertőződik a lisztharmat és a peronoszpóra által. A peronoszpóra, a késői fajtákban a felső, vitorla alatti fiatal leveleket fertőzheti erősen.

A szőlőmolyok károsítása folyamatos. A lepkék rajzása lezárult. A fiatal lárvák most jelentek meg a bogyókban. Vizsgáljuk át a fűrtöket, és ahol szövedéket vagy lárvára utaló rágást észlelünk, ott haladéktalanul permetezzünk. Az érés időszakában a lárvák egyenként rágják meg a bogyókat. A sérült bogyók hamar rothadásnak indulnak és az egész fűrt a szürkepenész károsításának eshet áldozatul.

Mind a gombaölő mind a rovarölő szerek kijuttatásánál ügyeljünk a jó fedettség elérésére. A mostani időszakban a 600 liter víz/ha vízmennyiséggel történő permetezés a legeredményesebb.

Az idei évben, ahol sikerült megmenteni a termést, a mostani időszakra szép fűrtők fejlődtek. Az tenyészedőszakban tapasztalható extrém csapadékellátottság miatt a bogyók és a fűrtők mérete jelentősen elkezdett növekedni az utóbbi napokban. A talajban lévő vízkészlet hatására, az idei évben, a fűrtők a szüretre nagyok, tömöttek lesznek, a bogyók egyenként erősen meg fognak duzzadni. Ez fokozott veszélyt jelent a repedés tekintetében.




**A meteorológiai állomások által mért adatok:**

<b>08.14.-08.20.</b>	<b>Heti átlaghőmérséklet (oC)</b>	<b>Csapadékösszeg (mm)</b>
<b>Csákberény</b>	<b>17,6</b>	<b>20,7</b>
<b>Csókakó</b>	<b>17,8</b>	<b>25,0</b>
<b>Mór</b>	<b>17,1</b>	<b>22,2</b>
<b>Zámoly</b>	<b>17,1</b>	<b>16,4</b>

Pénteken napos idő lesz. Zivatar kizárt. Eső nem esik. Gyenge, változó irányú lesz a légmozgás. Árnyalatnyit melegszik az idő. Éjszakára fátyolos felhőzet érkezik. Keddtől erős felmelegedés valószínű. A következő 7 napban a Borvidéken 12 mm csapadék várható. Az időjárás-előrejelzés 08.21-én (csütörtökön) készült, az ebből az időpontból előrelátható időjárást jelzi előre. A kiadás napjától távolodva a későbbiekben ez jelentősen változhat, ezért adott napra várható csapadékról <http://www.eumet.hu/> weboldalon érhetünk el információkat.

A fent felsorolt betegségek ellen a Syngenta a következő készítményeket ajánlja.

	<p>ajánlata erre a hétre: atkák ellen Thiovit Jet, Vertimec 1,8 EC            atkák ellen a Vertimec 1,8 EC lehetőség szerint önmagában kijuttatva            lisztharmat ellen Thiovit Jet, Topas 100 EC, Dynali            peronoszpóra ellen Bravo 500, Ridomil Gold MZ 68 WG, Pergado F            lisztharmat, peronoszpóra és szürkepenész ellen Quadris Max            szürkepenész ellen Switch 62,5 WG vagy Chorus 50 WG            szőlőmolyok ellen Affirm, Karate Zeon 5 CS            amerikai szőlőkabóca ellen Actara SC            gyomok ellen Medallon Prémium</p>
---	--

Néhány, gyakran használt készítmény élelmezés. eü. várakozási ideje:

Rezek 21 nap

Folpet és folpet tartalmú készítmények 30 nap

Chorus 14 nap

Switch 28 nap

Quadris Max 30 nap

Actara 21 nap

Dynali 21 nap